

ELIMINER MES RIDES DE LA LEVRE!

UN RESULTAT DEFINITIF POUR UN RAJEUNISSEMENT DE LA LEVRE



Le traitement des rides de la lèvre supérieure ne peut être pratiqué chirurgicalement! le relissage de cette zone peu accessible reste donc un dilemme si on veut éliminer de manière définitive ces rides du pourtour de la bouche qui gênent beaucoup de nos patientes aujourd'hui.

La demande de réparation de cette zone est croissante mais malheureusement les techniques jusqu'alors à notre disposition étaient invasives et présentaient des risques de dépigmentation post acte, telles que le laser resurfacing, la dermabrasion ou les peelings forts de type phénol !

De même les produits de comblement à l'acide hyaluronique largement utilisés pour le remplissage des rides afin de les atténuer, ne permettent pas l'obtention d'un relissage du contour péribuccal chez les patientes présentant des rides marquées.

Aujourd'hui, le peeling mixte TIMED® s'est imposé comme technique de choix pour éliminer définitivement les rides de la lèvre en 1 seule séance !!

Associant la combinaison du peeling électromécanique et d'un peeling chimique, le peeling mixte TIMED® va offrir un relissage parfait et en toute sécurité des rides péribuccales.

Un seul traitement va permettre d'obtenir un résultat d'excellent qualité et durable dans le temps.

Le succès de cette technique réside dans l'utilisation d'un générateur de courant électrique paramétré.

L'acte est simple et sans risque car il s'agit d'une technique standardisée qui assure la sécurité de l'acte.



Générateur TIMED

La réalisation de cet acte dure environ 30 minutes pendant lequel la patiente bénéficie d'une anesthésie locale qui aura été pratiquée au préalable rendant donc le traitement est indolore !

L'acte se pratique en deux temps :

Le premier temps est d'ordre mécanique, en effet, le médecin retire de manière sélective l'épiderme grâce à une électrode qui est reliée au dispositif médical électrique à haute fréquence qui génère une onde pulsée spécifique.

Le derme reste absolument intact contrairement aux autres techniques plus agressives.

Le deuxième temps consiste à appliquer sur cette zone désépidermée une solution de résorcine saturée dans de l'eau pendant 1 minute et 30 secondes.

La patiente peut repartir ensuite sans aucun pansement, ni médication particulière.

Une croûte va se former dans les jours suivants et se détachera spontanément sous 7 à 10 jours pour laisser apparaître une peau déjà lissée.

La rougeur présente de quelques

jours à 6 semaines pourra être masquée par un maquillage couvrant.

La zone traitée ne sera pas exposée au soleil durant 2 mois sans écran solaire préalable et ceci afin d'éviter les rebonds de pigmentation éventuels.

Les avantages de cette méthode sont nombreux :

La trame de la peau rajeunit, le résultat est stable, la patiente ne nécessite aucune médication et surtout la qualité de la peau reste naturelle contrairement à certaines techniques chimiques rendant la peau semblable à un visuel porcelaine !

L'éviction sociale sera partielle d'une dizaine de jours.

Ce traitement des rides profondes du pourtour péribuccal par le PEELING MIXTE TIMED® est donc une technique non invasive de choix pour un relissage parfait de la lèvre avec uniformité de la texture de la peau et résultat durable dans le temps !